

Cheryl Lawrence, MD, FAAP
Medical Director

يونيو / حزيران، 2024

Office of School Health

30-30 47th Ave.
Long Island City, NY 11101

السيدة (ة) الوالدة (ة) أو ولي (ة) الأمر،

قامت مدينة نيويورك بتحديث متطلبات اللقاحات للمدارس للعام الدراسي 2024-2025. تجد مع هذا الخطاب قائمة بمتطلبات اللقاحات للعام الدراسي 2024-2025. تحمي اللقاحات الأطفال من الأمراض ومن نشرها؛ وهي مطلوبة للأطفال كي يحضروا المدرسة. قبل بدء العام الدراسي، يجب عليكم تقديم إثبات على حصول طفلكم على اللقاحات أو نتائج اختبارات الدم التي تُظهر وجود مناعة لدى طفلكم إذا كان يداوم في برامج رعاية الأطفال أو في المدرسة.

يجب أن يستوفي جميع الأطفال في برنامج رعاية الأطفال حتى الصف 12 متطلبات اللقاحات الخاصة بالدفترية، والتيتانوس، والسعال الديكي (DTaP)؛ وفيروس شلل الأطفال (IPV أو OPV)، لكن لا يتم احتساب لقاح شلل الأطفال (OPV) إذا تم تلقيه بعد 1 أبريل/ نيسان، 2016؛ والحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية (MMR)؛ والجديري المائي/ الحماق، والإلتهاب الكبدي الوبائي من النوع ب (hepatitis B).

كما يجب أيضاً أن يستوفي الأطفال بعمر أقل من سنوات المسجلين في برنامج رعاية الأطفال أو في برنامج صف ما قبل الروضة متطلبات اللقاحات للإنفلونزا (نزلات البرد) (بحلول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2024)، ويُفضّل أن يكون ذلك حال توفر اللقاح في أوائل الخريف) ولقاح الأنفلونزا النزلية من النوع ب (Hib) ولقاح المكورات الرئوية المتقارنة (PCV). يجب أن يستوفي الأطفال في الصفوف من الصف 6 حتى الصف 12 متطلبات الجرعة التنشيطية لمرض التيتانوس، والدفترية، والسعال الديكي (Tdap) ولقاح المكورات السحائية المتقارنة (MenACWY).

إنّ اختبارات الدم التي تُظهر المناعة ضد مرض الحصبة الألمانية (MMR)، أو الحماق أو التهاب الكبد من النوع (ب) تستوفي أيضاً المتطلبات (اختبار المناعة ضد مرض شلل الأطفال مقبول فقط في حال تم إجراء الفحص المخبري لجميع الأنواع المصلية الثلاثة 1 و 2 و 3 قبل شهر سبتمبر/ أيلول، 2019).

فم بتخصيص الوقت هذا الصيف لمراجعة سجل لقاحات طفلكم مع مقدّم (ة) الرعاية الطبية الخاصة به. يمكن لمقدّم (ة) الرعاية الصحية الخاص بطفلكم إعلامك ما إذا كان من المطلوب حصول طفلكم على جرعات إضافية من لقاح أو أكثر كي يتمكن طفلكم من المداومة في برنامج رعاية الأطفال أو المدرسة. ملاحظة: إذا حصل طفلكم على جرعات من اللقاح قبل وصوله إلى الحد الأدنى من العمر (مبكراً جداً)، فلن يتم احتساب تلك الجرعات ضمن عدد الجرعات المطلوبة.

إذا كانت لديك أسئلة حول هذه المتطلبات للعام الدراسي 2024-2025، اتصل بمركز رعاية الأطفال الخاص بك أو بالمكتب الإداري بالمدرسة.

مع خالص التقدير والاحترام،



شيرلي لورانس/ Cheryl Lawrence، طبيبة، زميلة الجمعية الأمريكية لطب الأطفال (FAAP)
مديرة طبية
مكتب الصحة المدرسية

يجب على جميع التلاميذ من عمر شهرين إلى 18 عاماً في مدينة نيويورك الحصول على اللقاحات التالية للمداومة في برامج رعاية الأطفال أو المدرسة. نرجو مراجعة احتياجات اللقاحات الخاصة بطفلك بناء على مستوى صفه في هذا العام الدراسي. يوضح الجدول أدناه عدد الجرعات الصحيحة المطلوبة. إن عدد جرعات اللقاح التي يحتاجها طفلك قد تختلف حسب عمره والجرعات السابقة للقاح التي حصل عليها. قد يحتاج طفلك إلى لقاحات إضافية أو جرعات لقاح إذا كان يعاني من حالات صحية معينة أو إذا تم إعطاء جرعات سابقة في وقت مبكر جداً. لا يتم احتساب لقاح شلل الأطفال (OPV) إذا تم تلقيه بعد 1 أبريل/ نيسان، 2016. إن اختبارات الدم التي تُظهر المناعة ضد مرض الحصبة، أو النكاف و الحصبة الألمانية، أو الحمق أو التهاب الكبد من النوع (ب) تستوفي أيضاً المتطلبات (تعتبر المناعة ضد شلل الأطفال مقبولة فقط إذا أظهر الاختبار المخبري مناعة ضد جميع الأنماط المصلية الثلاثة وتم إجراؤه قبل سبتمبر/ أيلول 2019). لمزيد من المعلومات، تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلك، أو اتصل بالرقم 311، أو قم بزيارة الرابط nyc.gov/health وابحث عن "student vaccines" (لقاحات التلاميذ).

اللقاحات	برامج رعاية الأطفال، أو برامج (Head Start)، أو دور الحضّانة، أو برامج (3K)، أو صف الروضة	الصفوف من الروضة إلى الصف 5	الصفوف من 6 إلى 11	الصف 12
الدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي (DTaP)	أربع جرعات	خمس جرعات (أو أربع جرعات فقط إذا كان قد تم الحصول على الجرعة الرابعة في عمر 4 أعوام أو أكثر، أو ثلاث جرعات فقط إذا كان الطفل بعمر 7 أعوام أو أكثر وكانت سلسلة الجرعات قد بدأت في عمر عام واحد أو أكثر)	ثلاث جرعات	
الجرعة المنشطة للتيتانوس، والديفتيريا، والسعال الديكي (Tdap)			جرعة واحدة (مطلوبة في عمر 11 عاماً أو أكثر عند دخول الصفوف من الصف 6 إلى 12 وبالالتزام حتى عمر 11 عاماً)	
شلل الأطفال (IPV، أو OPV إذا كان قد تم تلقيه قبل 1 أبريل/ نيسان، 2016)	ثلاث جرعات	أربع جرعات (أو ثلاث جرعات إذا تم الحصول على الجرعة الثالثة في عمر 4 سنوات أو أكثر)		
الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان		
لقاح التهاب الكبد من النوع ب (Hepatitis B)	ثلاث جرعات	ثلاث جرعات	ثلاث جرعات (أو جرعتان اثنتان من لقاح التهاب الكبد من النوع ب (Hepatitis B) للكبار، (Recombivax HB)، إذا كان قد تم الحصول على الجرعات بفارق قدره أربعة أشهر على الأقل بين عمري 11 عاماً و15 عاماً)	
لقاح الحمق (Varicella) أو الجدري المائي (Chickenpox)	جرعة واحدة	جرعتان اثنتان		
المكورات السحائية المتقارنة (MenACWY)			الصف 6: لا ينطبق الصفوف من 7 إلى 11: جرعة واحدة	الصف 12: جرعتان اثنتان (أو جرعة واحدة إذا كانت الجرعة الأولى قد تم تلقيها في عمر 16 عاماً أو أكثر)
لقاح المستديمة النزلية المتقارنة من النوع ب (Hib).	جرعة واحدة إلى أربع جرعات (اعتماداً على عمر الطفل والجرعات التي تلقاها مسبقاً).			
لقاح المكورات الرئوية (PCV)	جرعة واحدة إلى أربع جرعات (بناءً على عمر الطفل(ة) والجرعات التي تلقاها مسبقاً)			
الانفلونزا (نزلات البرد)	جرعة واحدة			